



[www.JeffersonCountyPublicHealth.org](http://www.JeffersonCountyPublicHealth.org)



[www.jeffcoec.org](http://www.jeffcoec.org)

NOTA DE PRENSA

27 de diciembre, 2022

### Clínicas de Vacunaciones establecidas para el 8 y el 15 de enero

**CONDADO DE JEFFERSON**— Las clínicas de vacunación para niños y adultos se llevarán a cabo en enero. Detalles:

#### Sábado 8 de enero

Escuela Media/Secundaria de Chimacum, Salón de Multipropósitos

**10 AM-12 PM:** Pfizer ÚNICAMENTE para niños entre 5-11 años (primera o segunda dosis). La dosis de la vacuna para este rango de edades es la tercera parte de la dosis que se requiere para niños mayores y adultos.

Se requiere hacer cita: <https://prepmo.doh.wa.gov/appointment/en/reg/7962199340> o llame al 360-344-9791.

**1-4 PM:** Vacuna Moderna para edades entre 18 años y mayores (dosis primera, segunda o refuerzos)

Se requiere hacer cita: <https://prepmo.doh.wa.gov/appointment/en/reg/9127689090> o llame al 360-344-9791

#### Sábado 15 de enero

Escuela Secundaria en Quilcene

**10 AM-12 PM:** Pfizer ÚNICAMENTE para niños entre 5 y 17 años. La dosis de la vacuna para edades entre 5 y 11 es la tercera parte requerida para niños mayores y adultos. La dosis de refuerzo para jóvenes entre 12 y 15 años estará disponible dependiendo de la recomendación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. En estos momentos los refuerzos se recomiendan para personas mayores de 16 años o para aquellos que recibieron la segunda dosis de Pfizer al menos hace 6 meses. Las primeras, segundas y dosis de refuerzos estarán disponibles para los jóvenes dependiendo de su cualificación.

Se requiere hacer cita: <https://prepmo.doh.wa.gov/appointment/en/reg/8966107129> o llame al 360-344-9791.

**12:30-2:30 PM:** Vacuna Moderna para personas con 18 años o mayores (primera, segunda o refuerzos)

Se requiere hacer cita: <https://prepmo.doh.wa.gov/appointment/en/reg/1629985670> o llame al 360-344-9791.

Estas clínicas están organizadas y son operadas por el Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Jefferson y por el Departamento de Salud Pública del Condado de Jefferson. [The Jefferson County Department of Emergency Management and Jefferson County Public Health].

#### Más acerca de las cualificaciones/combinaciones:

- Usted debe recibir el refuerzo de la vacuna Moderna a los seis meses de haber recibido la segunda dosis. **Los refuerzos de Moderna son la mitad de las primera y segunda dosis.**
- Usted también podrá recibir el refuerzo de Moderna si han pasado seis meses después de haber recibido la segunda dosis de Pfizer o si han pasado dos meses desde su vacuna de Johnson & Johnson.

- Si usted está comprometido inmunológicamente, ya sea de manera moderada o severa, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades recomienda que reciba una tercera dosis completa. (Los refuerzos de Moderna son la ½ de la dosis). **Las terceras dosis completas NO serán ofrecidas en estas clínicas.** Si fuese necesario, contacte a su proveedor de salud o a su farmacia local para programar su tercera dosis.

### **Traiga su prueba de vacunación si programó para la segunda dosis o para los refuerzos.**

Las pruebas de vacunación incluyen la tarjeta de vacunas o una copia de los registros del Departamento de Salud del Estado de Washington Washington [State Department of Health], que pueden conseguirse de manera gratuita en la siguiente página <https://wa.myir.net/register>. Se aceptarán copias digitales o en papel de pruebas.

La clínica no reemplazará las tarjetas de vacunaciones. Si usted tiene una tarjeta de vacunaciones laminada, recibirá una tarjeta adicional que tendrá solamente la información de la dosis del refuerzo.

### **Otras maneras de recibir los refuerzos de la Moderna o la Pfizer:**

Las vacunaciones están disponibles también en algunas farmacias locales o a través de su proveedor de salud. Haga click aquí para tener más información: <https://jeffersoncountypublichealth.org/1529/COVID-19-Vaccine>.

### **Vacunación para niños en edades entre 5-11: Lo que debe saber antes de ir**

#### **Prepare a su niño para lo que va a suceder:**

- Tome en cuenta las inquietudes de su niño con respecto a recibir la vacuna.
- Si su niño tiene miedo por el dolor que puede causarle la aplicación de la vacuna, dígame que usted va a estar con él (ella) para que pueda apretarle la mano y todo pasará antes de contar hasta tres.
- Dígame que recibir la vacuna lo ayudará a estar sano y también contribuirá a que los que lo rodean estén saludables.

#### **¿Qué debe traer a su cita?:**

- Si aplica, traiga prueba de la primera dosis de la vacuna de su niño.
- Si es posible, trate que su niño use una camiseta con mangas cortas debajo de su chaqueta. Esto hará que los vacunadores tengan más fácil el acceso a la parte superior del brazo.
- Traiga un libro, su teléfono celular o su tableta para mantener a su niño ocupado mientras es monitoreado por los 15 minutos subsiguientes a la vacunación.
- Si usted trae más de un niño a la clínica de vacunación, considere traer a otra persona con usted para que lo (la) ayude.

#### **Posibles efectos secundarios:**

Su niño puede experimentar algunos efectos secundarios, con ambas dosis de la vacuna, tal como sucede con otras inmunizaciones. Estos efectos colaterales pueden incluir:

- Dolor, inflamación o enrojecimiento en el lugar de la vacuna
- Fiebre y escalofríos
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Dolor muscular y de las articulaciones

Estos efectos secundarios son leves y generalmente no duran más de 24-48 horas. Mientras ocurren dele a su niño muchos líquidos para beber, permítale que descanse más, y si fuese necesario puede darle medicinas de libre venta para aliviar el dolor, tales como ibuprofeno o acetaminofén. También puede colocar una bolsa de hielo en el sitio de la inyección para disminuir la sensibilidad local.